

## 接種前にお読みください

### 麻疹風しん混合（MR）ワクチン予防接種を受ける方へ

対象者	津島市に住民票のある昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、抗体検査の結果、十分な量の抗体がない方。
接種期間	2024年3月31日まで
接種場所	全国の実施医療機関 ※実施医療機関は厚生労働省のホームページ「風しんの追加的対策について」でご確認ください。
接種料金	無料（接種回数は1回に限ります。）
医療機関へ持参するもの	(1) マイナンバーカード、健康保険証など住所の確認できるもの (2) 予防接種クーポン券 (3) 風しん抗体検査受診票（抗体検査の結果が記入されたもの）
注意事項	(1) 事前に予約が必要です。 希望する医療機関に直接、または電話で予約をしてください。 予約日に、都合により接種できない場合や体調が悪い場合は予約先に連絡し、予約日を変更してください。

#### 【風しんの説明】

##### 1 風しんとは

風しんは、風しんウイルスの飛沫感染によって起こります。潜伏期間は14～21日間です。軽いかぜ症状ではじまり、発熱、発疹、耳の後ろのリンパ節の腫れなどが主症状とされていますが、症状が出ないこともあります。

抗体を持たない妊娠初期の妊婦が風しんウイルスに感染すると、心疾患、難聴、白内障などの先天性風しん症候群の赤ちゃんが生まれることがあります。

##### 2 麻疹風しん混合（MR）ワクチンによる副反応

副反応の主なものは、発熱、発疹です。他に局所反応、じんましん、リンパ節腫脹、関節痛、熱性けいれんの症状が現れる等の報告があります。また、これまでの麻疹ワクチン及び風しんワクチンの副反応のデータから、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、脳炎、けいれん等の副反応が、まれに生じる可能性もあります。

#### 【予防接種を受けることができない人】

##### 1 明らかに発熱のある人

一般的に熱のある人は、接種会場で測定した体温が37.5℃以上の場合をさします。

##### 2 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人

急性の病気で薬を飲む必要のある人は、その日の接種は見合わせるのが原則です。

##### 3 接種しようとする接種液の成分で、アナフィラキシーを起こしたことがある人

「アナフィラキシー」というのは通常接種後30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。発汗、顔が急に腫れる、全身にひどいじんましんが出るほか、はきけ、嘔吐（おうと）、声が出にくい、息苦しいなどの症状に続きショック状態になるような全身反応です。

##### 4 その他、医師が不適当な状態と判断した場合

1～3には入らなくても医師が当日の診察の結果、接種不適当と判断したときは接種できません。

お問い合わせ先 津島市保健センター ☎0567-23-1551